


# BETTER INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS EN PRÉVENTION

## FICHE-CONSEIL SUR L'IMMUNOSUPPRESSION

Les états de patients immunovulnérables comprennent les suivants :

- VIH
- Traitement pour le cancer (chimiothérapie, radiothérapie)
- Traitement suite à une transplantation d'organe
- Utilisation de médicaments (chronique) :



Si le patient signale l'une ou l'autre des affections ou des traitements ci-dessus, consultez le fournisseur de soins primaires pour déterminer si un dépistage plus poussé est nécessaire.

Remarque : cette liste de médicaments ou d'affections pouvant causer l'immunosuppression n'est pas exhaustive. Les médicaments énumérés sont administrés par injection ou par voie orale; il ne s'agit pas de crèmes ni de traitements topiques. Certains médicaments ont un effet dose-dépendant. En cas de doute, veuillez consulter votre équipe.



# BETTER INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS EN PRÉVENTION

## FICHE-CONSEIL SUR L'IMMUNOSUPPRESSION

### ANTIMÉTABOLITES

Azathioprine (Imuran)  
Méthotrexate (Metoject,  
Rheumatrex, méthotrexate  
de sodium)  
Mercaptopurine (Purinethol)

Bétaméthasone  
Budésonide (Cortiment, Entocort)  
Hydrocortisone  
Méthylprednisone  
Prednisone  
Prednisolone

### CORTICOSTÉROÏDES

### INHIBITEURS DU FNT

Adalimumab (Humira)  
Baricitinib (Olumiant)  
Certolizumab pégol (Cimzia)  
Étanercept (Enbrel)  
Infliximab (Remicade)

Aprémilast (Otezla)  
Basiliximab (Simulect)  
Bélimumab (Benlysta)  
Cyclosporine (Neoral)  
Mycophénolate (CellCept, Myfortic)  
Tacrolimus (Prograf, Advagraf)  
Sirolimus (Rapamune)  
Sulfasalazine (Azulfidine)

### AUTRES